

KenolacTM SD

BE
TEPELDIP / TEPELSPRAY OPLOSSING VOOR MELKVEE

TOEPASSING:
Ontsmetting van de spenen (bactericide werking).

GEBRUIKSAANWIJZING:

Het product is een gebruiksklaar tepeldipmiddel of tepelspraymiddel, toe te passen maximaal twee maal per dag na het melken. Gebruik ten minste 5 ml per koe per applicatie. Dip de spenen onmiddellijk na het melken. Zorg ervoor dat de speen voor drievierde van zijn totale lengte wordt bedekt. Als alternatief kan het hele oppervlak van elke speen volledig besprayed worden onmiddellijk na elke melkbeurt. De dipbeker of sprayer moet indien nodig bijgevuld worden. Als er een gemeenschappelijke dipbeker of sprayer wordt gebruikt voor de toepassing, moet er altijd een nieuwe oplossing worden gebruikt bij elke melkbeurt. De dipbeker of sprayer moet worden geledigd, gereinigd en gespoeld na elke melkbeurt of wanneer de beker wordt verontreinigd tijdens het melken. De resterende oplossing niet terug gieten in de originele verpakking. Gebruik het product niet voor het reinigen en / of ontsmetten van melkapparatuur.

BEWARING:

Recht op bewaren in de originele, goed afgesloten bus. Beschermen tegen vorst. Indien het product bevroren is, laten dooien in een warme plaats en goed schudden voor gebruik.

Genotificeerde actieve stoffen volgens richtlijn 528/2012: melkzuur: 3,6% (w/w) (CAS no.: 79-33-4). Gebruik in TP3 (veterinaire hygiënedoeleinden). Bevat Tartrazine. Enkel voor professioneel gebruik. Productvorm: SL.

Geschikt voor gebruik in de biologische landbouw volgens verordening (EG) N°834/2007. - Aanmeldingsnummer: 1492 - NOTIF 012

Let op:

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Het middel dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

FR
SOLUTION DE TREMPAGE / DE PULVÉRISATION
MAMMAIRE POUR LES BOVINS LAITIERS

APPLICATION:
Désinfection des trayons (activité bactéricide)

MODE D'EMPLOI:

Le produit est fourni prêt à l'emploi comme produit de trempage et de pulvérisation, à appliquer jusqu'à deux fois par jour. Utiliser au moins 5ml par vache par application. Tremper chaque trayon immédiatement après la traite. S'assurer que les trayons soient complètement couverts sur les trois quarts de la longueur. De manière alternative, pulvériser la surface entière de chaque trayon immédiatement après chaque traite. Le gobelet de trempage ou de pulvérisation doit être rempli si nécessaire. Si un gobelet de trempage ou de pulvérisation est utilisé pour l'application, une solution fraîche doit toujours être utilisée à chaque traite. Le gobelet de trempage ou de pulvérisation doit être vidé, nettoyé et rincé après chaque traite ou lorsque le produit est contaminé. Le produit restant dans le gobelet ou pulvérisateur ne doit jamais être reversé dans le container original. Le produit ne doit jamais être utilisé pour le nettoyage et/ou la désinfection du matériel de traite.

STOCKAGE : Stocker le produit dans l'emballage original correctement fermé et le conserver à l'abri du gel. Si le produit a gelé, le mettre à dégeler dans un endroit chaud. Secouer avant l'emploi. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Matière active notifiée selon la directive 528/2012: Acide lactique 3,6% (w/w), Utilisation en TP3 (Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire). Contient Tartrazine. Utilisation exclusivement professionnelle. Forme du produit: SL.

Utilisable en agriculture biologique en application du RCE N°834/2007 - N° 12873. Numéro de notification: NOTIF012.

Attention:

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets. Le produit ne doit pas contaminer les cours d'eau car il peut être dangereux pour les organismes aquatiques.

CID LINES FRANCE SARL 22 Rue Denis Papin F-59650 Villeneuve d'Ascq
00800/24 35 46 37



Ce pictogramme indique que l'emballage de ce produit peut être collecté par les distributeurs partenaires de la filière ADOVALOR



20 L

Lot: XXXXXXXXXX Prod: SEE CAN Exp: SEE CAN



(01) 0 5425014 74361 6 (10) XXXXXXXXXX

CID LINES

KenolacTM SD

NL

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op de spenen van melkkoeien na het melken.

De dosering en het gebruik van het middel zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden.

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestkelder.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksklaar middel voor desinfectie van de spenen van melkkoeien na het melken.

KenolacTM SD dient onverdund gebruikt te worden.

KenolacTM SD wordt aangebracht door middel van sprayen. Gemiddeld is per koe ongeveer 5 ml middel nodig.

De spenen onmiddellijk na het melken sprayen zodanig dat de spenen volledig bedekt zijn. Laat de spenen aan de lucht drogen en houd de koeien staand totdat het product is opgedroogd.

Toelatingsnummer: 14362N

Aard van het preparaat: vloeistof

Werkzame stof: 3,6% L-(+)-melkzuur